

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

BOLLETTINO n° 17 – 17 AGOSTO 2023



SITUAZIONE CLIMATICA

L'anticiclone Africano ha fatto valere la propria influenza per tutta l'ultima settimana, portando le **temperature minime e massime in ripresa**.



Precipitazioni quasi nulle negli ultimi dieci giorni, solamente qualche millimetro di pioggia caduto in maniera isolata nella tarda serata di ieri, mercoledì 16 agosto.

Insiste il trend siccitoso che ci ha accompagnato nell'ultima settimana, si prospetta quindi un periodo stabile, soleggiato e con le massime che supereranno in più di qualche occasione i 35°C.

Questo l'andamento medio delle temperature in **PIANURA**:



Questo l'andamento medio delle temperature in **COLLINA**:







CECAT

CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA


Nel grafico a seguire, l'andamento delle **piovosità** nell'ultima settimana, nelle principali località monitorate da **CECAT**:






CECAT

CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





Nel grafico a seguire, l'accumulo delle **piovosità** da inizio aprile a oggi, nelle principali località monitorate da **CECAT**:





CECAT

CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





SITUAZIONE FITOSANITARIA

Le piogge negli ultimi dieci giorni hanno lasciato spazio al tempo sereno, allerta però per le **prolungate bagnature fogliari mattutine**, che fanno tenere alta l'attenzione per attacchi da parte di **peronospora** e **botrite**. Si ricorda sempre l'importanza di operare la defogliazione e le adeguate pratiche per garantire un buon circolo dell'aria all'interno della chioma, evitando così la formazione di microclimi umidi favorevoli ai patogeni.

Per le aziende a **conduzione biologica** e a **conduzione convenzionale**, esclusivamente **per le varietà a maturazione media e tardiva**, si consiglia di ripetere la **copertura entro sabato 19 giugno**:

PERONOSPORA: **Poltiglia bordolese** (300 g/ha rame metallo)

OIDIO: **Zolfo** 3 kg ettaro

È in corso il monitoraggio tramite trappole a feromoni di **fignola** e **fignoletta**, continuano le catture della terza generazione.

Vista la forte presenza di **fignoletta** in diverse zone monitorate, nei vigneti in cui si riscontrano importanti catture è opportuno intervenire effettuando un trattamento a base di **Bacillus thuringiensis**, effettuando una ripetizione del trattamento dopo 7 giorni.

Si ricorda di tenere sempre conto delle limitazioni riportate in etichetta, nei Protocolli viticoli e nei Regolamenti di zona.

Segnalazioni di presenza di **mal dell'esca** nei diversi areali monitorati, sia in forma acuta, che cronica.

Cecat sta continuando l'attività settimanale di **monitoraggio degli adulti di Scaphoideus titanus**.

Dai dati del monitoraggio degli adulti di Scaphoideus titanus, per singola azienda, relativi alla settimana 32, si evidenzia che le catture sono in netto calo in tutti i vigneti monitorati, anche in quelli che presentavano più criticità.

La situazione sembra tornata sotto controllo; nel monitoraggio della settimana corrente andremo a verificare nuovamente la situazione della presenza di adulti su tutti gli areali monitorati.



SITUAZIONE FENOLOGICA

Proseguono i monitoraggi dell'avanzamento delle fasi fenologiche.

Nella maggior parte delle zone monitorate è possibile osservare per la Glera la fase di **invaiaitura** (fase fenologica BBCH 83, Baggiolini M), per le varietà a maturazione precoce si susseguono invece le **fasi di maturazione** (fase fenologica BBCH 85, Baggiolini N).

Continuano a cura di **CECAT** le consuete analisi sui mosti per determinare l'andamento della maturazione dei principali vitigni del nostro territorio.

In linea generale le varietà a maturazione anticipata hanno un **ritardo rispetto al 2022** di circa due settimane, seguono Glera e Cabernet Sauvignon con una decina di giorni di ritardo e infine Merlot, con circa una settimana di ritardo.

Per i Pinot più precoci la vendemmia potrebbe iniziare approssimativamente dalla settimana del 28 agosto, con i prossimi monitoraggi si avrà un'indicazione più chiara delle tempistiche per le altre varietà.

Riportiamo le medie delle analisi dei campioni CECAT del 16/08/2023:



VARIETA'	ZUCCHERI (BRIX)	ZUCCHERI (BABO)	pH	ACIDITA' (HTH g/l)
PINOT GRIGIO	14,8	12,6	2,94	12,6
CHARDONNAY	14,6	12,5	3,03	15,0
GLERA	9,1	7,8	2,78	21,9
MERLOT	15,7	13,3	3,02	14,1
CABERNET SAUVIGNON	13,5	11,5	2,90	21,9

Presentiamo nelle pagine a seguire le curve di maturazione dell'anno corrente (**2023**), dell'anno scorso (**2022**) e di due annate di riferimento in quanto precoce (**2007**) e tardiva (**2004**).



CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





CECAT



CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA







CECAT

CENTRO PER L'EDUCAZIONE,
LA COOPERAZIONE
E L'ASSISTENZA TECNICA





Grafici ed elaborazioni dati sono proprietà del CECAT, Centro per l'Educazione, la Cooperazione e l'Assistenza Tecnica, ed è pertanto vietato utilizzarli, riprodurli e/o modificarli inserendoli in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza l'esplicito consenso scritto del proprietario.